

Vorbereitung der Impfung

Vorbereitung der Durchstechflasche und Herstellung der Einmaldosis-Spritze

1. Vorbereitung der Durchstechflasche (5 Impfdosen)



1. Entnahme

Durchstechflaschen aus Gefrierschrank nehmen, öffnen und auf Beschädigungen oder fehlende Durchstechflaschen untersuchen



2. Auftauen

Empfehlung: Im Kühlschrank (volle Faltschachtel ca. 3 Stunden), alternativ bei Raumtemperatur (ca. 30 Minuten*); Datum und Uhrzeit notieren

* Für einzelne Durchstechflaschen



3. Prüfen

Auf Verfärbungen oder Partikel, Farbe: weiß bis gebrochen weiß; Raumtemperatur



4. Mischen

Vorsichtig 10 Mal umdrehen und dann violette Kappe abnehmen

Nicht schütteln!



5. Verdünnen*

Zugabe von 1,8 ml 0,9 % Natriumchlorid-Lösung in die Durchstechflasche; möglichst 2-ml-Spritze mit 21 Gauge verwenden; restliche Natriumchlorid-Lösung entsorgen

* Reinigen Sie davor den Flaschenverschluss mit einem antiseptischen Einwegtupfer



6. Druckausgleich

1,8 ml Luft aus Durchstechflasche in leere Diluent-Spritze ziehen; Entfernen der Nadel aus Durchstechflasche



7. Mischen

Vorsichtig 10-mal umdrehen; Farbe der Verdünnung: gebrochen weiße Suspension

Nicht schütteln!



8. Beschriften

Etikett mit Datum und Uhrzeit der Verdünnung beschriften; Haltbarkeit des vorbereiteten Impfstoffs: 6 Stunden nach Verdünnung bis 30 °C

2. Herstellung einer Einmaldosis-Spritze



1. Aufziehen*

0,3 ml der verdünnten Dosierlösung in sterile 1-ml-Luer-Spritze aufziehen; geeignete Kanüle für intramuskuläre Applikation verwenden

* Reinigen Sie davor den Flaschenverschluss mit einem antiseptischen Einwegtupfer



2. Prüfen

Auf Verfärbungen oder Partikel; Farbe: weiß bis gebrochen weiß, **endgültiges Injektionsvolumen: 0,3 ml**



3. Verabreichen

Innerhalb von 6 Stunden nach Verdünnung (Aufbewahrung bei 2 °C bis 30 °C)




Wichtige Hinweise

- Haltbarkeit der aufgetauten, noch nicht verdünnten Durchstechflasche bei Raumtemperatur (bis 30 °C) 2 Stunden, im Kühlschrank (2-8 °C) 120 Stunden bzw. 5 Tage
- Aufgetaute Durchstechflaschen nicht wieder einfrieren
- Bitte wenden Sie sich an den BioNTech Kundenservice, falls der Impfstoff unerwünschte Verfärbungen oder Partikel aufweist oder die Durchstechflasche beschädigt ist



Informationen für Fachkreise

Fachinformation mit Hinweisen zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Gegenanzeigen und mehr finden Sie auf der Fachkreisseite: fachkreise.biontech.de



Weitere Informationen und ausführliche Video-Anleitung unter: impfzentrum.biontech.de/video



Alle Anleitungen detailliert nachlesen in der dazugehörigen Handlungshilfe



Sicherheitshinweise in der Handlungshilfe, im Sicherheitsdatenblatt und bei Ihrer Abteilung für Arbeitsschutz



BioNTech Kundenservice
Tel: +49 6131 9084-0, Fax: -2121
E-Mail: service@biontech.de
Täglich 8 – 22 Uhr