

Impfstoff	Zulassung ab	Anpassungen	Haltbarkeit	Anpassungen	im Kühlschrank haltbar	Kühlschrank (2-8°C)	Raumtemperatur	Dosen pro Vial	Anzahl Impfdosen/Abstand	STIKO - Hinweise
Biontech/Pfizer Comirnaty®	12 Jahre		6 Monate -75°C ± 15°C	14 Tage -20°C ± 5°C	ungeöffnet 31 Tage	/	Ungeöffnet 2h (max. 30°C) Rekonstituiert 6h (2°C - 30°C)	6 Dosen je Impfdosis: 0,3ml	2 Dosen / min. 3 Wochen STIKO: 6 Wochen	nur vorerkrankte Schwangere mit höherem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes ab 2. Trimenon
Moderna	18 Jahre		7 Monate -25°C bis -15°C		ungeöffnet 30 Tage	/	Ungeöffnet 12h (8°C – 25°C) Geöffnet 6h (2°C – 25°C)	10 Dosen je Impfdosis: 0,5ml	2 Dosen / 4 Wochen	nur vorerkrankte Schwangere mit höherem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes ab 2. Trimenon
AstraZeneca "Vaxzevria®"	18 Jahre (STIKO -Empfehlung ab 60 Jahre)	STIKO-Empfehlung ab 60 Jahre	6 Monate 2°C bis 8 °C		ungeöffnet 6 Monate	geöffnet 48h	Geöffnet 6h (max. 30°C)	10 Dosen je Impfdosis: 0,5ml	2 Dosen / 4-12 Wochen STIKO = 12 Wochen GMK = 4 Wochen	< 60 Jahre: nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch die impfwillige Person möglich ! Heterologes Impfschema für Zweitimpfung mit mRNA Impfstoff nach 12 Wochen
Johnson & Johnson "Janssen®"	18 Jahre (STIKO -Empfehlung ab 60 Jahre)	STIKO-Empfehlung ab 60 Jahre	2 Jahre -25°C bis -15°C		ungeöffnet 3 Monate	geöffnet 6h	Ungeöffnet 12h (9°C – 25°C) Geöffnet 3h (max. 25°C)	5 Dosen je Impfdosis: 0,5ml	1 Dosis	< 60 Jahre: nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch die impfwillige Person möglich !

Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten !